

Tabla S1. Características de laboratorio y DAS28-PCR basales y en el seguimiento a 3 y 6 meses.

Características	Basal	A los 3 meses	A los 6 meses	p basal vs los 3	p basal vs los 6	p 3 vs 6 meses
Laboratorios, mediana (RIC)^a						
PCR (mg/dl)	0,84 (0,41 – 1,78)	0,6 (0,21 – 1,2)	0,44 (0,21 – 1,1)	0.016	<0.001	0.12
VSG (mm/h)	16 (7 - 27)	15 (7 - 25)	12 (7 - 22)	0.748	0.030	0.101
AST (U/L),	19 (16 - 24)	20 (16 - 27)	21 (17 - 28)	0.023	0.012	0.043
ALT (U/L),	20 (15 - 26)	22 (17 - 37)	22 (18 - 32)	<0.001	0.004	0.724
Creatinina (mg/dL)	0,73 (0,65 - 0,80)	0,74 (0,64 - 0,84)	0,71 (0,68 - 0,80)	0.714	0.386	0.317
Leucocitos (/μL)	7.550 (6.210 - 8.910)	6.440 (5.040 - 7.610)	6.050 (4.860 - 7.200)	<0.001	<0.001	0.071
Neutrófilos (/μL)	4.690 (3.530 - 6.490)	4.045 (2.870 - 5.090)	3.715 (2.780 - 4.465)	<0.001	<0.001	0.138
Linfocitos (/μL)	1.785 (1.430 - 2.200)	1.560 (1.200 - 2.100)	1.400 (1.240 - 1.990)	0.001	<0.001	0.073
Hemoglobina gr/dl	13,9 (13,2 - 14,6)	14,0 (12,8 - 14,5)	13,8 (13,0 - 14,6)	0.333	0.620	0.946
Plaquetas (/1.000μL)	317 (268 - 377)	297 (258 - 365)	286 (246 - 336)	0.047	<0.001	0.041
Puntaje de actividad de la enfermedad y respuesta al tratamiento						
DAS28-PCR, mediana (RIC) ^a	4,0 (3,6 - 4,7)	2,6 (1,8 - 3,8)	2,1 (1,7 - 3,1)	<0.001	<0.001	<0.001
DAS28-PCR por categorías [†]						
En remisión, n (%)	0	38 (50)	58 (67)	<0.001	<0.001	0.003
Baja actividad, n (%)	2 (2)	8 (10)	9 (10)	0.039	0.024	0.819
Moderada actividad, n (%)	74 (82)	28 (37)	19 (22)	<0.001	<0.001	0.126
Alta actividad, n (%)	14 (16)	2 (3)	1 (1)	0.001	<0.001	0.581
Criterios de respuesta EULAR ^{b†}						
Ninguna, n (%)	-	20 (27)	14 (17)	NA	NA	0.305
Moderada, n (%)	-	15 (21)	12 (15)	NA	NA	0.452
Buena, n (%)	-	38 (52)	54 (68)	NA	NA	0.016

^a Variables analizadas con la prueba de rangos con signo de pares emparejados de Wilcoxon

^b Variables analizadas con la diferencia de proporciones para datos emparejados

[†] El registro del DAS28-PCR se obtuvo en 76 (84,4%) participantes al seguimiento a 3 meses y 87 (97%) participantes al seguimiento a 6 meses.

* El cálculo de la respuesta por criterios EULAR se obtuvo en 73 (81,1%) participantes al seguimiento a 3 meses y 80 (88.9%) participantes al seguimiento a 6 meses.

ALT: alanino transferasa; AST: aspartato transferasa; DAS28-PCR: Disease Activity Score 28 con proteína C reactiva; RIC: rango intercuartílico; PCR: proteína C reactiva; VSG: velocidad de sedimentación globular.

Tabla S2. Regresión lineal múltiple para identificación de factores de riesgo que afectan el cambio en el DAS28-PCR.

Variabes	Cambio del DAS28-PCR	IC del 95%	p
Regresión lineal múltiple a 3 meses			
Edad (años)	-0,02	-0,04 a 0,01	0,128
Femenino	-0,19	-0,97 a 0,61	0,639
Títulos del factor reumatoide	0,00	-0,01 a 0,01	0,972
Títulos del ACPA	0,00	-0,01 a 0,01	0,334
Enfermedad erosiva	-0,53	-1,18 a 0,12	0,110
Regresión lineal múltiple a 6 meses			
Edad (años)	-0,02	-0,04 a 0,01	0,115
Femenino	-0,51	-1,45 a 0,41	0,270
Títulos del factor reumatoide	0,00	-0,01 a 0,01	0,805
Títulos del ACPA	0,00	-0,01 a 0,01	0,170
Enfermedad erosiva	-0,05	-0,78 a 0,67	0,888

ACPA: anticuerpos antipéptido citrulinado; DAS28-PCR: Disease Activity Score 28 con proteína C reactiva.