

**ENCUESTA DE MORBILIDAD REALIZADA ENTRE LA COMUNIDAD  
INDIGENA CUNA DE CAIMAN NUEVO**

**TURBO, ANTIOQUIA - JULIO 1975**

Por:

*Arenas Max. MD. MSP.\**  
*Cifuentes Alejo. MD. MSP.\*\**  
*González Germán. MD. ESP.\*\*\**  
*Sánchez Hernán. OD. MSP.\*\*\*\**  
*Vasco Alberto. MD. MSP. MS.\*\*\*\*\**  
*Zambrano Fernando. MD. ESP.\*\*\*\*\**

**Participantes:**

Arbeláez Silvia. Enfermera S.S.A.  
Gómez María E. Bacterióloga S.S.A.  
Hoyos Humberto. MD. Unidad Regional Oriente S.S.A.  
Mariaka Pedro. CMV. MSP. S.S.A.  
Olivares Piedad. Bacterióloga S.S.A.  
Yepes Federico. MD. Director Centro Salud Necoclí. S.S.A.

- \* Residente Epidemiología Escuela Nacional de Salud Pública.
- \*\* Coordinador del Programa de Control de T.B.C. - S.S.A. de Antioquia.
- \*\*\* Epid.: Profesor de Epidemiología Escuela Nacional de Salud Pública.
- \*\*\*\* Odontólogo Supervisor Servicio Seccional de Salud de Antioquia.
- \*\*\*\*\* Jefe Departamento Ciencias Básicas Escuela Nacional de Salud Pública.
- \*\*\*\*\* Epid.: Jefe Sección Epidemiología Escuela Nacional de Salud Pública.

## 1. INTRODUCCION

En Colombia no existen aún adecuados sistemas de información en salud y por tanto no se conoce la evolución de la morbilidad y la mortalidad; este hecho que es real para las zonas urbanas, es más claro y evidente para las rurales; se desconoce la patología de ciertos grupos sociales y entre estos se distinguen especialmente los grupos indígenas, los cuales carecen totalmente de servicios médicos que son llevados a cabo por personal autóctono, por lo que sobrevive una medicina folklórica cuyos posibles aportes al conocimiento científico no han sido estudiados.

- Con el objeto de conocer algunos aspectos de la morbilidad de estos grupos mencionados, se escogió a la comunidad Cuna que habita una región situada al norte del Departamento de Antioquia, en jurisdicción del Municipio de Turbo; comprendiendo el paraje denominado "Caimán Nuevo" a lado y lado del río del mismo nombre, desde su nacimiento en la Serranía del Darién, hasta su desembocadura en el Golfo de Urabá. Esta comunidad habita tierras que en su mayoría son planas, con pequeñas elevaciones de abundante vegetación, pertenecientes al piso térmico cálido.

Antropológicamente los Cunas descienden del grupo caribe. Socialmente se agrupan en familias regidas por un cacique quien representa la máxima autoridad dentro de la tribu (1). Tanto su cultura como su organización social están en plena descomposición por los efectos devastadores de la iniciativa privada y la civilización occidental.

## 2. MATERIAL Y METODOS

Se seleccionó como población de estudio, la totalidad de los indios Cunas residentes en Caimán Nuevo. De la totalidad de la población se presentaron 304 personas (91o/o) a los cuales se les hizo una entrevista, según formulario especialmente diseñado, y se les practicó un examen físico completo y algunos exámenes de laboratorio: Coprológico, hematocrito, hemoglobina, serología (electiva), gota gruesa (electiva), tuberculina, baciloscopia (a sintomáticos respiratorios), examen bucodental y medidas antropométricas. Se determinaron también las condi-

ciones sanitarias de la vivienda a través de una muestra aleatoria simple.

Para la toma de medida de peso y talla se normalizaron las básculas, los metros de tela y los procedimientos utilizados.

En cuanto a la presión arterial se emplearon tensiómetros de mercurio, también normalizados y se aceptaron los criterios sugeridos por la OMS para definir Hipertensión, es decir, cifras iguales o mayores de 160/95 siendo un sólo dato suficiente.

## 3. RESULTADOS

### 3.1. Aspectos demográficos.

Existe un ligero predominio del sexo femenino. Ver Tabla No. 1. Se observa además que hay un predominio de los hombres en los grupos de edad menores de 15 años, presentándose luego una inversión de esta relación, haciéndose favorable a las mujeres (Cuadro No.1). Una posible causa de este patrón pudiera ser explicada por los riesgos laborales a que están sometidos los hombres a diferencia de las mujeres cuyo trabajo es sobre todo doméstico. Hay que destacar el hecho de que casi un 70o/o de la población está por debajo de los 20 años, por lo tanto, los grupos etáreos mayores presentan variaciones que pueden ser atribuidas al poco número de personas, en consecuencia se muestra un corte claro a partir de los 20 - 24 años (Gráfico No. 1).

### 3.2. Peso y Talla

#### 3.2.1. Peso.

El promedio de peso es sensiblemente igual en ambos sexos (Ver Tabla No. 2). Los promedios por grupo de edad tienden a ser mayores en los hombres, en los primeros y en los últimos grupos de edad; sin embargo las diferencias y el número de personas en cada categoría son tan pequeñas que no vale la pena sacar conclusiones al respecto.

TABLA No. 1

POBLACION CUNA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO - 1975

Edad	Hombres	o/o	Mujeres	o/o	Total	o/o
< 1	7	4.73	5	3.20	12	3.95
1 - 4	21	14.19	18	11.54	39	12.38
5 - 9	27	18.24	25	16.02	52	17.10
10 - 14	23	15.54	18	11.54	41	13.49
15 - 19	21	14.19	29	18.59	50	16.45
20 - 24	13	8.78	15	9.61	28	9.21
25 - 29	9	6.08	10	6.41	19	6.25
30 - 34	1	0.67	6	3.85	7	2.30
35 - 39	10	6.76	15	9.61	25	8.22
40 - 44	4	2.70	0	0.00	4	1.31
45 - 49	6	4.05	6	3.85	12	3.95
50 - 54	3	2.02	3	1.92	6	1.97
55 - 59	0	0.00	1	0.67	1	0.33
60 - 64	2	1.35	4	2.56	6	1.97
65 y más	1	0.67	1	0.67	2	0.67
Total	148	48.68	156	52.32	304	100.00

GRAFICO No. 1.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION  
CUNA (CAIMAN NUEVO) SEGUN EDAD Y SEXO

1.975



