

Minicasos

ACANTOSIS NIGRICANS ORAL

Andrés Cortés Bedoya
Fernando Vallejo Cadavid
Luis Alfonso Correa Londoño
Juan Carlos Wolff Idárraga

Paciente de 66 años, natural de Medellín y residente allí, quien consulta por presentar lesiones de la mucosa oral de seis meses de evolución asociadas a malestar general, astenia, adinamia y pérdida de peso.

Entre sus antecedentes personales se encuentra que al paciente se le diagnosticó carcinoma gástrico hace diez años.

Andrés Cortés Bedoya, residente de Dermatología de la Universidad de Antioquia.

Fernando Vallejo Cadavid, Dermatólogo y Docente de la Universidad de Antioquia.

Luis Alfonso Correa Londoño, Dermatólogo y Docente de la Universidad de Antioquia.

Juan Carlos Wolff Idárraga, Dermatólogo y Docente de la Universidad de Antioquia.

Correspondencia: Andrés Cortés Bedoya. Institución Universidad de Antioquia.

Dirección: Departamento de Dermatología de la Universidad de Antioquia, Medellín.

Teléfono - Fax: (4) 263 7667.

Email: andrescbc@gmail.com

ACRODERMATITIS CRÓNICA ATRÓFICA EXTENSA

Víctor Adolfo Benítez Campo
Luis Fernando Balcázar
Antonio José Torres

Enfermedad actual: Paciente de sexo femenino, de 74 años, raza mestiza, ama de casa, con cuadro de cuatro años de lesiones que comenzaron en la superficie extensora de los muslos, con máculas eritematosas, pruriginosas, que se tornaron induradas. Posteriormente progresó a los miembros superiores y al tronco. Las lesiones evolucionaron progresivamente con marcada atrofia cutánea.

Examen físico: Paciente ambulatoria, con placas eritematosas induradas, de bordes mal definidos, en los muslos,

las piernas y los brazos. Otras lesiones en el tronco con bordes bien definidos, engrosados, de aspecto queloidiano, con centro marcadamente atrófico, visualizándose fácilmente la vasculatura subcutánea. En el tronco las lesiones ocupaban exactamente el área fotoprotegida.

Sensibilidad normal. Antecedentes personales y familiares negativos.

Los paraclínicos fueron normales e incluyeron: Hemograma, RPR, Elisa para VIH, glicemia, creatinina, parcial de orina, pruebas hepáticas.

Se tomó biopsia de piel de la espalda, observándose una atrofia tan marcada que se lesionó levemente la fascia. A la histopatología se observó infiltrado perivascular superficial y profundo, compuesto por linfocitos y abundantes plasmocitos; marcada atrofia epidérmica. Con base en criterio clínico y de histopatología se hace diagnóstico de acrodermatitis crónica atrófica con extensión al tronco.

Se inició tratamiento con doxiciclina 200 mg/día y fototerapia UVB de banda estrecha. Actualmente se le está haciendo seguimiento clínico a la paciente.

Víctor Adolfo Benítez Campo. Residente de Dermatología. Universidad del Valle.

Luis Fernando Balcázar. Dermatólogo y Docente de la Universidad del Valle.

Antonio José Torres. Docente de Dermatopatología de la Universidad del Valle.

Correspondencia: Hospital Universitario del Valle. Departamento de Dermatología. Consulta Externa 4to piso. Teléfono: 556 0233 Cali. E mail: victor3636@emcali.net.co

ALOPECIA FRONTAL FIBROSANTE: REPORTE DE DOS CASOS

Claudia Valencia Rúa
Ángela Londoño
Rodrigo Restrepo

Presentamos el caso de dos mujeres en edad posmenopáusica, quienes muestran una retracción en la línea de implantación del pelo en el área fronto-temporal. A la histología de ambas se observa disminución en el número de folículos pilosos, los cuales son reemplazados por tractos